

∞ Baccalauréat Première Métropole-La Réunion Série n° 2 ∞
série technologique e3c n° 34 mai 2020

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES - Première technologique

PARTIE I

Exercice 1

5 points

Automatismes

Sans calculatrice

Durée : 20 minutes

	Énoncé	Réponse
1.	Écrire $\frac{7}{6} - \frac{1}{9}$ sous la forme d'une fraction irréductible.	
2.	Calculer 30 % de 30 % de 600.	
3.	Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 12 % ?	
4.	Développer $(5x - 2)^2$.	
5.	Calculer $f(-2)$ avec $f(x) = 3x^3 - 2$.	
6.	Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $5x - 4 = 5x - 24$	
7.	Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $x^2 = 64$.	
8.	D est la droite d'équation $y = -5x + 3$. Compléter :	$A(2 ; \dots) \in D$
9.	Déterminer l'équation réduite de la droite (MN) avec $M(3 ; 5)$ et $N(-6 ; 2)$.	
10.	Convertir 0,125 L en mL.	

PARTIE II

Calculatrice autorisée

Cette partie est composée de trois exercices indépendants

Exercice 2, avec ordinateur

5 points

On considère la fonction Python suivante :

```
def f(x):
    return 0.1*x**3-1,305*x**2+4,65*x-3,2
```

Cette fonction Python correspond à une fonction f définie sur $[0; 8]$.

1.
 - a. Donner l'expression de $f(x)$. On rappelle que x^n se note $x * * n$ en Python.
 - b. Calculer $f(0)$ et $f(2,5)$.
2. On admet que la fonction f est croissante sur $[0; 2,5]$. On considère la fonction Python balayage1 ci-dessous.

```
def balayage1(y,xmin,pas):
    x = xmin
    while f(x)<=y:
        x=x+pas
    return x-pas
```

Appeler balayage1(0,0,0,000 01). Quel est le résultat trouvé, à 0,000 01 près par défaut, et à quoi correspond-il?

3. On admet que la fonction f est décroissante sur $[2,5; 6,2]$.

En vous aidant de la fonction Python précédente balayage1, écrire une fonction Python balayage2 qui permet de résoudre dans $[2,5; 6,2]$ l'équation $f(x) = k$ d'inconnue x , lorsque k est un réel appartenant à l'intervalle $[f(6,2); f(2,5)]$.

Exercice 3

5 points

Une usine de fabrication de vélos électriques a une capacité de production de 70 vélos par jour. Pour x vélos produits et vendus, avec x dans $[0; 70]$, le chiffre d'affaires en centaines d'euros est donné par $A(x) = 8x$ et le coût de production en centaines d'euros est donné par

$$C(x) = 0,001x^3 + 0,075x^2 + 3,8x + 16.$$

1. Montrer que le résultat $R(x) = A(x) - C(x)$ réalisé par la vente de x vélos est donné par

$$R(x) = -0,001x^3 - 0,075x^2 + 4,2x - 16.$$

2. a. Déterminer $R'(x)$, où R' est la dérivée de la fonction R sur l'intervalle $[0; 70]$.
 b. Montrer que pour tout x dans $[0; 70]$ on a $R'(x) = -0,003(x + 70)(x - 20)$.
 c. Étudier le signe de $R'(x)$ puis en déduire le tableau de variations de la fonction R sur $[0; 70]$.
3. Suivant ce modèle, combien de vélos l'entreprise doit-elle produire et vendre par jour pour réaliser un résultat maximum? Quel est ce résultat maximum?

Exercice 4

5 points

Un artiste de rue réalise des mosaïques à l'aide de carreaux de couleurs. Il a 1 500 carreaux, dont 25 % sont jaunes, sont bleus et les autres sont rouges. Certains des carreaux sont abîmés. Un dixième des carreaux bleus sont abîmés. Pour les jaunes, 96 % ne sont pas abîmés. Au total, il y a 117 carreaux abîmés.

1. Recopier **sur votre copie** et compléter le tableau suivant :

Carreaux	Jaunes	Bleus	Rouges	Total
Abîmés				117
Non abîmés				
Total				1 500

2. L'artiste prend un carreau au hasard, tous les carreaux ayant la même probabilité d'être choisis.
 Arrondir toutes les réponses au millième près, si nécessaire.
- a. Déterminer la probabilité d'avoir un carreau abîmé.
 b. Déterminer la probabilité d'avoir un carreau rouge qui n'est pas abîmé.
 c. Déterminer la probabilité de ne pas avoir un carreau bleu.
 d. On note A : l'évènement « le carreau est rouge » et B l'évènement « le carreau n'est pas abîmé ».
 Calculer $P_B(A)$, au millième près, et décrire par une phrase en français la signification de cette probabilité.