

Corrigé J2

ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ

Exercice 1

6 points

Partie A

1. La variable aléatoire X compte le nombre de succès d'une répétition de 10 épreuves de Bernoulli. Les épreuves sont indépendantes deux à deux. La probabilité du succès est $p = 0,4$. Donc X suit une loi binomiale de paramètres $10; 0,4$: $X \sim \mathcal{B}(10; 0,4)$.

2. a. $P(X = 2) = \binom{10}{2} \times p^2 \times (1 - p)^{10-2} = \binom{10}{2} \times 0,4^2 \times 0,6^8 \approx 0,1209$

b. Comme les événements $\{X = i\}$ et $\{X = j\}$ sont disjoints pour $i \neq j$:


$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(\{X = 0\} \cup \{X = 1\} \cup \{X = 2\}) \\ &= \sum_{i=0}^2 P(X = i) \\ &= \sum_{i=0}^2 \binom{10}{i} p^i (1 - p)^{10-i} \\ &\approx 0,1673 \end{aligned}$$

La probabilité que le phénomène El Niño soit dominant au plus deux années sur une période de 10 ans est d'environ 0,1673.

3. Comme X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,4)$: $E(X) = n \times p = 10 \times 0,4 = 4$. En moyenne le phénomène El Niño est dominant quatre années sur une période de 10 ans.

Partie B

1.



2. $p_0 = 0$

$1 - p_0 = 1$

$p_1 = P(E_1) = P(E_0) \times P_{E_0}(E_1) + P(\overline{E_0}) \times P_{\overline{E_0}}(E_1) = 0 \times 0,5 + 1 \times 0,3 = 0,3$

3. $p_{n+1} = P(E_{n+1}) = P(E_n) \times P_{E_n}(E_{n+1}) + P(\overline{E_n}) \times P_{\overline{E_n}}(E_{n+1})$
 $= p_n \times 0,5 + (1 - p_n) \times 0,3 = 0,2 \times p_n + 0,3$

4. a. En utilisant la calculatrice la suite (p_n) semble être croissante et avoir pour limite 0,375.

n	p_n
0	0
1	0,3
2	0,36
3	0,372
\vdots	\vdots
13	0,374 999 999 692 8
14	0,374 999 999 938 56

b. On formule l'hypothèse de récurrence $\mathcal{H}(n) : p_n \leq 0,375$.

On vérifie que $\mathcal{H}(0)$ est vraie (initialisation).

Comme $p_0 = 0 \leq 0,375$, $\mathcal{H}(0)$ est vraie.

Montrons que $\mathcal{H}(n) \Rightarrow \mathcal{H}(n+1)$ (hérédité).

On suppose que $\mathcal{H}(n)$ est vraie, avec $n \in \mathbb{N}$.

$$p_{n+1} = 0,2 \times p_n + 0,3$$

D'après $\mathcal{H}(n)$, $p_n \leq 0,375$, en multipliant par 0,2 on obtient :

$$0,2 \times p_n \leq 0,075, \text{ en ajoutant } 0,3 \text{ on obtient :}$$

$$0,2 \times p_n + 0,3 \leq 0,375, \text{ ainsi on obtient :}$$

$$p_{n+1} \leq 0,375 \text{ (}\mathcal{H}(n+1)\text{ est vérifiée)}$$

D'après le principe de récurrence,

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0, p_n \leq 0,375$$

c. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, p_n désignant une probabilité est un nombre positif.

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$p_{n+1} - p_n = -0,8 \times p_n + 0,3$$

$$p_{n+1} - p_n \geq -0,8 \times 0,375 + 0,3$$

$$p_{n+1} - p_n \geq 0$$

Ceci étant valable quelque soit le choix de n , $\forall n \in \mathbb{N}$, $p_{n+1} - p_n \geq 0$, donc (p_n) est croissante.

d. (p_n) est croissante et majorée donc (p_n) est convergente vers l . De plus $l \leq 0,375$.

5. a.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= p_{n+1} - \frac{3}{8} \\ &= 0,2 \times p_n + 0,3 - \frac{3}{8} \\ &= 0,2 \times p_n + 0,2 \times \frac{3}{2} - 0,2 \times \frac{15}{8} \\ &= 0,2 \times p_n + 0,2 \times \left(\frac{3}{2} - \frac{15}{8} \right) \\ &= 0,2 \times p_n + 0,2 \times \left(-\frac{3}{8} \right) \\ &= 0,2 \times \left(p_n - \frac{3}{8} \right) \end{aligned}$$

Finalement quel que soit n naturel, $u_{n+1} = 0,2 \times u_n$: ceci prouve que (u_n) est une suite géométrique de raison 0,2.

$$u_0 = p_0 - \frac{3}{8} = 0 - \frac{3}{8} = -\frac{3}{8}$$

Le premier terme est donné par : $u_0 = -\frac{3}{8}$

b. Comme (u_n) est une suite géométrique de raison 0,2 de premier terme $u_0 = -\frac{3}{8}$:

$$\forall n \in \mathbb{N} : u_n = -\frac{3}{8} \times 0,2^n$$

$$\text{Comme } \forall n \in \mathbb{N} : u_n = p_n - \frac{3}{8},$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : p_n = -u_n + \frac{3}{8} = (-0,2^n + 1) \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8} (1 - 0,2^n)$$

c. Comme $0,2 < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,2^n = 0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{3}{8}$

d. La probabilité d'observer un phénomène El Niño dominant tend vers $\frac{3}{8}$ quand le nombre d'années d'observation augmente.

Exercice 2

5 points

1. $\binom{14}{2} \times \binom{10}{2} = 4095 \neq 272$.

L'énoncé indique « est-il possible » et ne fait pas intervenir le nombre maximum de groupes composés de deux filles et deux garçons. Comme $272 < 4095$, **l'affirmation est vraie.**

2. f est dérivable comme composée de fonctions dérivables.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 6 \times \cos(2x + \pi)$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 6 \times \cos\left(2 \times \frac{\pi}{2} + \pi\right) = 6$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3 \times \sin\left(2 \times \frac{\pi}{2} + \pi\right) = 0$$

L'équation de la tangente au point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ est donnée par :

$$y = \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \times f'\left(\frac{\pi}{2}\right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$y = 6x - 6 \times \frac{\pi}{2}$$

$$y = 6x - 3\pi$$

L'affirmation est vraie.

3. $\forall x \in]0 ; +\infty[$, $F'(x) = \frac{2x \ln x + 2x + 1}{x}$, en particulier $F'(1) = \frac{3}{2}$ et $f(1) = 2$. f n'est pas la dérivée de F . Ainsi on montre que F n'est pas une primitive de f .

L'affirmation est fausse.

4. $g(0) = 45 \times e^0 + 20 = 65$

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad g'(t) + 0,06 \times g(t) = 45 \times 0,06 \times e^{0,06t} + 0,06 \times (45 \times e^{0,06t} + 20) = 5,4 \times e^{0,06t} + 1,2$$

g n'est pas solution de (E) .

L'affirmation est fausse.

5. Soit y une solution positive de (E_2) on peut écrire $\forall x \in \mathbb{R} \quad y'(x) = y(x) + 3e^{0,4x}$, comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad y(x) \geq 0$ et $3e^{0,4x} \geq 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R} \quad y'(x) \geq 0$.

On dérive l'équation différentielle :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad y''(x) = y'(x) + 1,2e^{0,4x}. \text{ Comme } \forall x \in \mathbb{R} \quad y'(x) \geq 0 \text{ et } 1,2e^{0,4x} \geq 0, \text{ alors}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad y''(x) \geq 0.$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad y''(x) \geq 0 \text{ donc } y \text{ est convexe sur } \mathbb{R}.$$

L'affirmation est vraie : les solutions positives de (E_2) sont des fonctions convexes sur \mathbb{R} .

Exercice 3**4 points****Partie A**

1. $-x^2 + 7x + 8 = 0$ admet -1 comme solution évidente. L'autre solution de l'équation du second degré est donc 8 .

Le trinôme est négatif (du signe du coefficient de x^2), sauf entre les racines, d'où le tableau de signes de $x \mapsto -x^2 + 7x + 8$:

x	$-\infty$	-1	8	$+\infty$	
signe de $-x^2 + 7x + 8$	-	0	+	0	-

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-x^2 + 7x + 8 \geq 0$ sur \mathbb{R} est l'intervalle $[-1 ; 8]$

2. Pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $]0 ; 8]$, $-x^2 + 7x + 8 \geq 0$. D'où en ajoutant 1 à chaque membre $-x^2 + 7x + 9 \geq 1$.

Comme la fonction logarithme népérien est une fonction croissante on a pour tout x appartenant à $]0 ; 8]$, $\ln(-x^2 + 7x + 9) \geq \ln(1)$. C'est à dire $\ln(-x^2 + 7x + 9) \geq 0$.

Pour tout x appartenant à $]0 ; 8]$, $x > 0$ et $10 \ln(-x^2 + 7x + 9) \geq 0$, donc $f(x) = \frac{10 \ln(-x^2 + 7x + 9)}{x} \geq 0$.

3. Sur l'intervalle $]0 ; 8]$ la courbe représentative est au dessus de l'axe des abscisses.

Partie B

1. Pour $x \in]0 ; 8]$, $M\left(x, \frac{10 \ln(-x^2 + 7x + 9)}{x}\right)$ et donc $N(x, 0)$ et $P\left(0, \frac{10 \ln(-x^2 + 7x + 9)}{x}\right)$.

2. Comme pour $x \in]0 ; 8]$, l'abscisse de N est positive et l'ordonnée de P est positive.

On peut écrire $ON = x$ et $OP = \frac{10 \ln(-x^2 + 7x + 9)}{x}$.

L'aire de $ONMP$ vaut $ON \times OP$ donc :

$$\forall x \in]0 ; 8] \quad \mathcal{A}(x) = x \times \frac{10 \ln(-x^2 + 7x + 9)}{x} = 10 \ln(-x^2 + 7x + 9)$$

3. Sur $]0 ; 8]$, $-x^2 + 7x + 9 > 0$ donc \mathcal{A} est une fonction dérivable de la variable x sur $]0 ; 8]$ comme composée de fonction définies et dérivables.

$$\forall x \in]0 ; 8[, \mathcal{A}'(x) = 10 \times \frac{-2x + 7}{-x^2 + 7x + 9}.$$

S'il existe $x \in]0 ; 8]$ telle que $\mathcal{A}(x)$ soit maximale, il faut que $\mathcal{A}'(x) = 0$

Pour $x \in]0 ; 8]$, $-x^2 + 7x + 9 > 0$, $\mathcal{A}'(x)$ est donc du signe de $-2x + 7$.

$$\mathcal{A}'(x) \geq 0 \iff -2x + 7 \geq 0$$

$$\mathcal{A}'(x) \geq 0 \iff x \leq \frac{7}{2}$$

\mathcal{A} est croissante sur $\left]0 ; \frac{7}{2}\right[$ et décroissante sur $\left]\frac{7}{2} ; 8\right[$.

La dérivée s'annule en $\frac{7}{2}$, en étant positive avant puis négative après, donc la fonction \mathcal{A} a un maximum sur $]0 ; 8]$:

$$\mathcal{A}\left(\frac{7}{2}\right) = 10 \ln(17) + 10 \ln(5) - 20 \ln(2) \approx 30,56$$

Partie C

1.

```

1 from math import *
2
3 def A(x):
4     return 10*log(-1 * x**2 + 7*x + 9)
5
6 def pluspetitevaleur(k):
7     x = 3.5
8     while A(x) > k:
9         x = x + 0.1
10    return x

```

2. `>>>pluspetitevaleur(30)`
4.5999999999999998

3. Lorsque $k = 35$, la condition $A(x) > 35$ n'est pas vérifiée donc le contenu de la boucle n'est pas exécuté. L'appel `pluspetitevaleur(35)` renvoie 3.5.

Exercice 4**5 points**

1. a. On calcule les coordonnées de \overrightarrow{AB} et de \overrightarrow{AC} .

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On constate que $\frac{-5}{2} \neq \frac{-4}{5}$. Comme les coordonnées des vecteurs ne sont pas proportionnelles, \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} ne sont pas colinéaires et A, B et C ne sont pas alignés.

b. D appartient au plan (ABC) si et seulement si les coordonnées de D vérifient l'équation cartésienne du plan (ABC).

$29 \times (-3) + 30 \times (-4) - 17 \times 6 = -309 \neq 35$. Les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation cartésienne du plan (ABC), donc les points A, B, C, D ne sont pas coplanaires.

2. a. Les coordonnées du milieu de [AB] sont : $\frac{4+(-1)}{2}$; $\frac{-1+1}{2}$; $\frac{3+(-2)}{2}$ soit $\frac{3}{2}$; 0 ; $\frac{1}{2}$.

b. Un vecteur normal au plan P_1 médiateur du segment [AB] est le vecteur $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

donc une équation de P_1 est $5x - 2y + 5z = k$ avec k tel que les coordonnées du milieu de [AB] vérifient l'équation c'est-à-dire si

$$5 \times \frac{3}{2} - 2 \times 0 + 5 \times \frac{1}{2} = k = 10$$

Ainsi $5x - 2y + 5z = 10$ est une équation cartésienne de P_1 .

3. a.

$$\begin{aligned} MC^2 &= (x-0)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 - 8y - 10z + 16 + 25 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 - 8y - 10z + 41 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} MD^2 &= (x-(-3))^2 + (y-(-4))^2 + (z-6)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 8y - 12z + 9 + 16 + 36 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 8y - 12z + 61 \end{aligned}$$

M appartient à P_2 est équivalent à $MC^2 = MD^2$.

$$\begin{aligned} MC^2 = MD^2 &\iff MC^2 - MD^2 = 0 \\ &\iff x^2 + y^2 + z^2 - 8y - 10z + 41 \\ &\quad - x^2 - y^2 - z^2 - 6x - 8y + 12z - 61 = 0 \\ &\iff -6x - 16y + 2z - 20 = 0 \\ &\iff -6x - 16y + 2z = 20 \\ &\iff -3x - 8y + z = 10 \end{aligned}$$

On obtient l'équation cartésienne de P_2 : $-3x - 8y + z = 10$.b. Un vecteur normal à P_1 est le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.Un vecteur normal à P_2 est le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.On remarque que $\frac{5}{-2} \neq \frac{-3}{-2}$

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires car leur coordonnées ne sont pas proportionnelles.

Comme les vecteurs normaux à P_1 et P_2 ne sont pas colinéaires, alors les plans P_1 et P_2 sont sécants.

4. $\forall t \in \mathbb{R} \quad 5 \times (-2 - 1,9t) - 2 \times t + 5 \times (4 + 2,3t) = -10 - 9,5t - 2t + 20 + 11,5t = 10$

Tout point de Δ appartient à P_1 .

$\forall t \in \mathbb{R} \quad -3 \times (-2 - 1,9t) - 8 \times t + (4 + 2,3t) = 6 + 5,7t - 8t + 4 + 2,3t = 10$

Tout point de Δ appartient à P_2 . Δ est donc la droite d'intersection de P_1 et P_2 .5. D'après la représentation paramétrique de Δ , un vecteur directeur de Δ est le vec-teur $\vec{\delta}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 19 \\ -10 \\ 23 \end{pmatrix}$.Le plan P_3 admet un vecteur normal \vec{n}_3 de coordonnées $\begin{pmatrix} 8 \\ -10 \\ -4 \end{pmatrix}$.La droite Δ et le plan P_3 ne sont pas sécants si et seulement si un vecteur directeur de Δ est orthogonal à un vecteur normal au plan P_3 .

On calcule le produit scalaire des deux vecteurs précités :

$$\vec{\delta} \cdot \vec{n}_3 = 19 \times 8 + (-10) \times (-10) + 23 \times (-4) = 160 \neq 0$$

Le produit scalaire n'est pas nul, les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, Δ et P_3 sont donc sécants.

6. On considère le point H équidistant des points A, B, C, D. Comme $AH = BH$, H appartient à P_1 . Comme $DH = CH$, H appartient à P_2 . Ainsi H appartient à l'intersection des deux plans, la droite Δ . Comme $AH = CH$, H appartient au plan P_3 . Ainsi H est l'intersection de Δ et de P_3 .

Le point équidistant des sommets d'un tétraèdre est l'intersection des plans médiateurs de ses arêtes.

On peut déterminer les coordonnées de H.

Il suffit de résoudre l'équation :

$$8(-2 - 1,9t) - 10t - 4(4 + 2,3t) = -15$$