

∞ Baccalauréat mathématiques élémentaires ∞

Dakar juin 1964

I.

Un point M est animé d'un mouvement vibratoire simple sur un axe $x'Ox$. Le centre de ce mouvement est l'origine. La période du mouvement est $\frac{1}{10}$ seconde et, à l'instant initial, le mobile est à 5 cm du centre et a une vitesse de 6 cm/s.
Écrire l'équation du mouvement de ce mobile.

II.

Lieu du centre des cercles tangents à une droite fixe (D) et orthogonaux à un cercle fixe (Γ), dans le cas où (D) est tangent à (Γ).

III.

Dans le plan des axes rectangulaires, Ox , Oy , on considère la courbe (C) représentant la variation de la fonction

$$y = \frac{1}{x^2}.$$

1. Tracer la courbe (C).

Former l'équation de la tangente à cette courbe au point M dont l'abscisse a une valeur donnée a . Calculer en fonction de a les coordonnées du point K où cette tangente coupe à nouveau la courbe (C).

2. On suppose $a > 1$; soit A le point d'abscisse 1 sur la courbe (C).

Calculer, en fonction de a , la valeur S de l'aire comprise entre l'arc \widehat{AM} de la courbe (C) et sa corde.

Montrer que S est dans un rapport constant avec le produit de la quantité $(a - 1)^3$ par l'ordonnée du point M .

3. Montrer que, quels que soient a et λ , la courbe de variation (P) de la fonction

$$y = \frac{3}{a^2} - \frac{2x}{a^3} + \lambda(x - a)^2$$

est tangente à la courbe (C) au point M d'abscisse a .

Former l'équation du second degré ayant pour racines les abscisses des points, M' , M'' , où se coupent, en dehors du point M , les courbes (P) et (C).

Dessiner sur une même figure la courbe (C) et la courbe (P) obtenues pour $a = 1$, $\lambda = -1$.