

∞ Baccalauréat C Étranger groupe I juin 1981 ∞

EXERCICE 1

Calculer les intégrales

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 x \, dx, \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 x \sin x \, dx, \quad K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \cos x \, dx.$$

EXERCICE 2

On sait que tout rationnel r peut être représenté, de façon unique, par une fraction irréductible ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$).

Soit f l'application de \mathbb{Q} dans \mathbb{N}^* définie par $f(r) = q$.

1. Montrer que 1 est une période de f .
2. a et b étant deux entiers naturels, montrer que si a et b sont premiers entre eux, alors $a + b$ est premier avec a et avec ab .
3. On désigne par $r_0 = \frac{p_0}{q_0}$ (p_0 et q_0 premiers entre eux) un nombre rationnel de l'intervalle $]0; 1[$.

Montrer qu'il existe des rationnels de la forme $\frac{p_0}{q}$ (p_0 et q premiers entre eux) tels que

$$f\left(\frac{p_0}{q} + \frac{p_0}{q_0}\right) = q \cdot q_0$$

En déduire que 1 est la plus petite période de f .

PROBLÈME

Partie A

Soit f la fonction de \mathbb{R} vers \mathbb{R} définie par

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}.$$

1. Étudier f et construire sa courbe représentative (Γ) dans le plan affine euclidien \mathcal{E} , rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
2. Démontrer que (Γ) est incluse dans une conique \mathcal{C} dont on précisera les asymptotes et les sommets.

Partie B

1. Soit A, B, M , trois points de \mathcal{E} de coordonnées respectives $(1; 0)$ pour A ; $(2; 0)$ pour B ; $(x; y)$ pour M .

M se projette orthogonalement en K sur la droite passant par A et de vecteur directeur \vec{j} , en H sur la droite passant par O et de vecteur directeur \vec{i} .

- a. Établir que si M a une abscisse différente de 2 et une ordonnée non nulle, il existe une unique application affine notée Φ_M telle que

$$\Phi_M(M) = M, \quad \Phi_M(H) = K, \quad \Phi_M(B) = A.$$

- b. Quelle relation doit-il exister entre les coordonnées $(x; y)$ de M pour que Φ_M soit une similitude indirecte?
2. On pose $\Gamma^* = \Gamma \setminus \{A, B\}$ (c'est-à-dire Γ privée des points A et B).
Quelle est la nature de Φ_M quand M est un point de Γ^* ? Préciser alors les éléments géométriques et la forme réduite caractérisant Φ_M .
3. M étant un point de Γ^* , on définit le réel k_M par

$$\left\| \overrightarrow{M\Phi_M(B)} \right\| = k_M \left\| \overrightarrow{MB} \right\|.$$

- a. x désignant l'abscisse de M , montrer que

$$k_M = \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}{|x - 2|}$$

- b. Soit g la fonction qui à x associe k_M . Établir que g est une bijection de son ensemble de définition sur son ensemble image et qu'il n'existe aucun point M de Γ^* tel que Φ_M soit une isométrie.

Partie C

1. $(M, M') \in \Gamma^* \times \Gamma^*$. Quelle est la nature de $\Phi_{M'} \circ \Phi_M$?
2. Établir que pour tout point M de Γ^* , il existe un unique point M' de Γ^* tel que $\Phi_{M'} \circ \Phi_M$ soit une isométrie.
Préciser le point M' , et les éléments géométriques caractérisant alors l'isométrie $\Phi_{M'} \circ \Phi_M$.
Quel est l'ensemble décrit par son centre ω quand M décrit Γ^* ?