

Durée : 4 heures

∞ Baccalauréat S La Réunion juin 2007 ∞

EXERCICE 1

5 points

Commun à tous les candidats

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels strictement positifs tels que  $a < b$ .

On désigne par A et par B les points d'abscisses respectives  $a$  et  $b$  de la courbe  $\Gamma$  représentative de la fonction logarithme népérien dans un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Les points Q et R sont les projetés orthogonaux respectifs des points A et B sur l'axe des ordonnées.

- Donner l'équation réduite de la tangente (T) au point A à la courbe  $\Gamma$ .
  - Déterminer l'ordonnée du point d'intersection P de (T) avec l'axe des ordonnées. Calculer la longueur PQ. En déduire une construction simple de (T); la réaliser sur la figure en annexe).

2. Restitution organisée de connaissances

On suppose connue la propriété :

« Pour tout couple  $(x ; y)$  de nombres réels strictement positifs, on a  $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$ . »

En déduire que, pour tout nombre réel  $m$  strictement positif, on a  $\ln(\sqrt{m}) = \frac{1}{2} \ln(m)$ .

- Utiliser le résultat de la question 2 pour placer sur l'axe des abscisses le point G d'abscisse  $\sqrt{ab}$ . Expliquer la construction et la réaliser sur la figure de l'annexe 1 (on laissera les traits de construction apparents).

EXERCICE 2

4 points

Commun à tous les candidats

Soit  $a$  un nombre réel tel que  $-1 < a < 0$ .

On considère la suite  $u$  définie par  $u_0 = a$ , et pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_{n+1} = u_n^2 + u_n.$$

- Étudier la monotonie de la suite  $u$ .
- Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = x^2 + x$ . Étudier le sens de variations de la fonction  $h$ .  
En déduire que pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $] -1 ; 0[$ , le nombre  $h(x)$  appartient aussi à l'intervalle  $] -1 ; 0[$ .
  - Démontrer que pour tout entier naturel  $n$  on a :  $-1 < u_n < 0$ .
- Étudier la convergence de la suite  $u$ . Déterminer, si elle existe, sa limite.

**EXERCICE 3****6 points****Commun à tous les candidats**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par : 
$$\begin{cases} f(x) = \frac{xe^x}{e^x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 1. \end{cases}$$

On note  $\mathcal{C}$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1. **a.** Déterminer la limite de  $f$  en  $-\infty$ .
  - b.** Établir que, pour tout nombre réel  $x$  non nul, on a  $f(x) = x \left(1 + \frac{1}{e^x - 1}\right)$ .  
En déduire la limite de  $f$  en  $+\infty$ .
2. Donner, sans démontrer, la limite suivante :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1}$  et démontrer que  $f$  est continue en 0.
3. **a.** Démontrer que, pour tout nombre réel  $x$ , on a :  $e^x \geq x + 1$ , et que l'égalité n'a lieu que pour  $x = 0$ .
  - b.** Calculer la dérivée  $f'$  de la fonction  $f$  et déterminer la fonction  $g$  telle que, pour tout nombre réel  $x$  non nul,  $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(e^x - 1)^2}$ .
  - c.** Donner le tableau des variations de  $f$ .
4. Soient  $x$  un nombre réel non nul et les points  $M(x; f(x))$  et  $M'(-x; f(-x))$  de la courbe  $\mathcal{C}$ .
  - a.** Établir que  $f(-x) = \frac{x}{e^x - 1}$ , puis déterminer le coefficient directeur de la droite  $(MM')$ .
  - b.** On admet que la fonction  $f$  est dérivable en 0. Que suggère alors le résultat précédent ?

**EXERCICE 4****5 points****Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité**

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

A, B, C désignent les points d'affixes respectives  $a = -2\sqrt{3}$ ,  $b = \sqrt{3} - 3i$  et  $c = 2i$ .

1. **a.** Écrire  $b$  sous forme exponentielle.
  - b.** Les points A et C sont représentés sur la figure jointe en annexe 2.  
Construire à la règle et au compas le point B sur ce dessin (laisser les traces de construction apparentes).
2. On désigne par E le barycentre du système  $\{(A; 1); (C; 3)\}$  et par F le barycentre du système  $\{(A; 2); (B; 1)\}$ .
  - a.** Établir que l'affixe  $e$  du point E est égale à  $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$ .
  - b.** Déterminer l'affixe  $f$  du point F.
3. **a.** Démontrer que le quotient  $\frac{e - c}{e - b}$  peut s'écrire  $ki$  où  $k$  est un nombre réel à déterminer.  
En déduire que, dans le triangle ABC, le point E est le pied de la hauteur issue de B. Placer le point E sur le dessin.

- b. Démontrer que le point F possède une propriété analogue. Placer F sur le dessin.
4. On désigne par H le barycentre du système  $\{(A; 2); (B; 1); (C; 6)\}$ . Démontrer que le point H est le point d'intersection des droites (BE) et (CF).  
Qu'en déduit-on pour le point H?

**EXERCICE 4****5 points****Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité**

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

A, B, C, désignent les points d'affixes respectives  $a = -2\sqrt{3}$ ,  $b = \sqrt{3} - 3i$  et  $c = 2i$ .

1.
  - a. Écrire  $b$  sous forme exponentielle.
  - b. Les points A et C sont représentés sur la figure jointe en annexe 2.  
Construire à la règle et au compas le point B sur ce dessin (laisser les traces de construction apparentes).
  - c. Déterminer une mesure en radians de l'angle  $(\vec{u}; \overrightarrow{AB})$  et de l'angle  $(\vec{u}; \overrightarrow{AC})$ .
2. Les points E et F ont pour affixes respectives  $e = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$  et  $f = -\sqrt{3} - i$ .
  - a. Démontrer que les points A, E et C, d'une part, et les points A, F et B, d'autre part, sont alignés,
  - b. Démontrer que le quotient  $\frac{e-c}{e-b}$  peut s'écrire  $ki$  où  $k$  est un nombre réel à déterminer.  
Interpréter géométriquement ce résultat.  
On admet que, de façon analogue,  $\frac{f-c}{f-b}$  peut s'écrire  $k'i$  où  $k'$  est un nombre réel non nul que l'on ne demande pas de déterminer.
  - c. Placer les points E et F sur la figure.
3. On désigne par S la similitude indirecte dont l'écriture complexe est

$$z \mapsto \frac{1}{2}\bar{z} - \sqrt{3}.$$


Déterminer les images par S des trois points A, B et C.

4. Soit H le point d'intersection des droites (BE) et (CF). Placer le point S(H) sur la figure.

## ANNEXE 1

(À rendre avec la copie)

## Exercice 1



## ANNEXE 2

*(À rendre avec la copie)***Exercice 4**