

∞ **Baccalauréat Métropole septembre 1954** ∞
Série mathématiques et mathématiques et Technique

I.

1^{er} sujet

Calculer la dérivée de $y = \sqrt{u}$, où u est une fonction donnée de la variable x ; on aura soin de préciser les hypothèses qui rendent ce calcul valable.

Application : Calculer la dérivée y' de $y = \sqrt{2x^2 - 4x}$; pour quelles valeurs de x les fonctions y et y' sont-elles définies?

I.

2^e sujet

Étudier et représenter graphiquement la fonction

$$y = \frac{3x}{(2x-1)(x-2)}$$

(unité de longueur : 1 cm sur Ox et Oy).

I.

3^e sujet

$y = f(x)$ étant une fonction positive décroissante dans l'intervalle (a, b) et x un nombre compris entre a et b ($a < x < b$), montrer que l'aire comprise entre la courbe représentative, l'axe $x'x$ et les parallèles à $y'y$ d'abscisses a et x est une primitive de $f(x)$.

Application : l'unité de longueur étant le centimètre, évaluer l'aire comprise entre la courbe représentative de $y = 5 \cos \frac{x}{3}$, l'axe $x'x$ et les droites d'abscisses $\frac{\pi}{2}$ et π .

II.

Soient (O) un cercle fixe, de centre O , de rayon r , AB un diamètre fixe de ce cercle, (D) la tangente au cercle (O) au point A , et (Δ) la tangente au cercle (O) au point B .

Une sécante variable issue de B coupe (D) en P et (O) en R . La droite AR coupe (Δ) en Q . Soit M le milieu de AP .

1. Montrer que MR est tangente en R au cercle (O) .

Quelles sont les polaires par rapport à (O) des points M et Q ?

Établir que le cercle (Γ) de diamètre MQ est orthogonal à (O) .

2. On appelle F et F' les extrémités du diamètre de (O) perpendiculaire à AB .

Montrer que (Γ) est orthogonal à tout cercle passant par F et F' .

Quelle est la tangente en M au cercle circonscrit au triangle MFF' ?

3. Montrer qu'il existe une ellipse (E) de foyers F et F' tangente à (D) . Préciser ses éléments en fonction de r .

Montrer que MQ est la seconde tangente issue de M à cette ellipse.

4. MQ coupe BP en S et AB en T .

Montrer que S et T sont conjugués harmoniques par rapport à M et Q et que le cercle circonscrit au triangle SFF' passe par T ; en déduire que S est le point de contact de MQ avec (E) .