

❧ Baccalauréat C Nantes juin 1981 ❧

EXERCICE 1

Soit \mathbb{N}^* l'ensemble des entiers naturels non nuls. On considère, lorsque n appartient à \mathbb{N}^* , les deux entiers a et b :

$$a = 11n + 3 \quad ; \quad b = 13n - 1.$$

1. Démontrer que tout diviseur de a et b est un diviseur de 50.
2. Résoudre pour $x \in \mathbb{N}^*$, $y \in \mathbb{N}^*$, l'équation :

$$50x - 11y = 3.$$

En déduire les valeurs de n pour lesquelles les nombres a et b ont 50 pour plus grand commun diviseur.

3. Pour quelles valeurs de n , les nombres a et b ont-ils 25 pour plus grand commun diviseur?

EXERCICE 2

Le plan affine \mathcal{P} étant rapporté au repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On désigne par A et B les points de \mathcal{P} de coordonnées respectives (1, 0) et (0, 1) dans ce repère.

À tout point M de coordonnées $(x; y)$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on lui associe, lorsqu'il existe, le barycentre M' des points O, A, B, affectés respectivement des coefficients 1, x , y . On définit ainsi une fonction

$$\begin{aligned} f: \mathcal{P} &\rightarrow \mathcal{P} \\ M &\mapsto M'. \end{aligned}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition \mathcal{E} de f .
2. Déterminer l'image de \mathcal{E} par f .
3. Déterminer l'ensemble des points M de \mathcal{P} tels que $f(M) = M$.

PROBLÈME

Dans tout le problème, λ désigne un nombre réel positif non nul.

Soit e_1 et e_2 les fonctions numériques définies par :

$$\begin{aligned} e_1: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & e_2: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto e^\lambda \cos x & & & x &\mapsto e^\lambda \sin x. \end{aligned}$$

Soit E l'espace vectoriel engendré par e_1 et e_2 .

Soit Φ l'application de $E \times E$ dans \mathbb{R} définie par

$$\forall (f, g) \in E^2 = \Phi(f, g) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)e^{-2\lambda t} dt.$$

- Démontrer que Φ est un produit scalaire et que (e_1, e_2) est une base orthonormée de E pour Φ . Dans toute la suite du problème E est muni de la structure d'espace vectoriel euclidien associée à Φ et est orienté en considérant (e_1, e_2) comme une base directe.
- À toute fonction f de E on associe la fonction $D(f)$ définie par

$$\forall x, x \in \mathbb{R}, \quad D(f)(x) = f'(x)$$

où f' désigne la fonction dérivée de f .

Démontrer que, pour tout f de E , $D(f)$ appartient à E et que l'application D ainsi définie est un endomorphisme de E .

Déterminer la matrice de D dans la base (e_1, e_2) . Démontrer que D est le produit d'une rotation vectorielle et d'une homothétie vectorielle et d'une homothétie vectorielle de rapport un réel strictement positif que l'on déterminera.

En déduire que D est inversible.

- À toute fonction f de E , on associe la fonction $T(f)$ définie par

$$\forall x, x \in \mathbb{R}, \quad T(f)(x) = \int_x^{x+\pi} f(t) dt.$$

Démontrer que $T(f)$ appartient à E et que l'application :

$$\begin{array}{ccc} T: & E & \rightarrow & E \\ & f & \mapsto & T(f) \end{array}$$

est un endomorphisme de E .

Calculer $(T \circ D)(e_1)$, $(T \circ D)(e_2)$.

Déduire des résultats précédents que D^{-1} est la composée de T et d'une homothétie vectorielle de rapport k qu'on déterminera.

- On note T^n et D^n les endomorphismes définis par :

$$\begin{array}{l} T^0 = I; \quad \forall n, n \in \mathbb{N}, \quad T^{n+1} = T^n \circ T \\ D^0 = I; \quad \forall n, n \in \mathbb{N}, \quad D^{n+1} = D^n \circ D \end{array}$$

On note $\|\cdot\|$ la norme associée au produit scalaire Φ .

Soit f un élément de E .

- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par

$$u_n = \|D^n(f)\|.$$

Cette suite est-elle convergente?

- Soit g la fonction :

$$\begin{array}{ccc} g: & \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & e^{x^2} + 1 - \sqrt{x^2 + 1}. \end{array}$$

Démontrer que g est croissante sur \mathbb{R}_+ . En déduire que $g(x)$ est strictement positif pour tout x positif.

- c.** En déduire la nature de la suite numérique $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
- 5.** À tout élément $f = ae_1 + be_2$ de E , où a et b sont des nombres réels, on associe le nombre complexe $a + ib$.
- a.** Calculer le nombre complexe associé à $D(f)$ à partir de celui associé à f .
- b.** Calculer le nombre complexe associé à $T(f)$ à partir de celui associé à f .
- c.** En déduire une explication des résultats obtenus pour D et T au cours des questions 2, 3 et 4.