

∞ Baccalauréat E Aix – Corse – Limoges – Toulouse – Nice ∞  
juin 1981

**EXERCICE 1**

Soit la fonction  $f$  définie de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  par

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{Log} |x^2 - x - 2| && \text{pour } x \text{ élément de } \mathbb{R}^-, \\ f(x) &= -1 + \text{Log}(x+2) + e^x && \text{pour } x \text{ élément de } \mathbb{R}^{+*}. \end{aligned}$$

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  sur son ensemble de définition.
2. Étudier les variations de  $f$  et tracer sa courbe représentative dans un repère ortho-normé.
3. Soit  $g$  la restriction de  $f$  à  $] -\infty ; -1[$ .  
Montrer que  $g$  est bijective de  $] -\infty ; -1[$  vers un intervalle que l'on déterminera.  
Calculer  $g^{-1}(2)$ .

**EXERCICE 2**

1. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation (E)

$$z^3 - (2 - i)z^2 + (5 - 3i)z - 2 + 6i = 0$$

sachant que l'une des solutions est imaginaire pure. Soit  $z_1$  cette solution.

On trouvera deux autres solutions, on appellera  $z_2$  celle de partie imaginaire négative et  $z_3$  celle de partie imaginaire positive.

2. Soit A le point d'affixe  $z_1$ , B le point d'affixe  $z_2$ , C le point d'affixe  $z_3$  et  $\Omega$  le point d'affixe 1.  
On définit la similitude directe  $s$  telle que

$$\begin{cases} s(A) = \Omega \\ s(B) = C. \end{cases}$$

Déterminer son centre, son rapport et une mesure de son angle.

**PROBLÈME**

**Partie A**

Soit  $E_3$  espace vectoriel euclidien rapporté à la base orthonormée  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

Pour  $(a; b)$  élément de  $\mathbb{R}^2$ , on définit  $\varphi_{a, b}$ , endomorphisme de  $E_3$ , par

$$\begin{cases} \varphi_{a, b}(\vec{i}) = (3a + b)\vec{i} - 4a\vec{j} \\ \varphi_{a, b}(\vec{j}) = -4a\vec{i} - (3a - b)\vec{j} + b\vec{k} \\ \varphi_{a, b}(\vec{k}) = \vec{k}. \end{cases}$$

- Déterminer le noyau et l'image de  $\varphi_{a,b}$ . Discuter suivant les valeurs de  $a$  et  $b$ .  
Pour quelles valeurs de  $(a; b)$   $\varphi_{a,b}$  est-elle bijective?
- Déterminer les couples  $(a; b)$  pour lesquels  $\varphi_{a,b}$  est une isométrie vectorielle.
- Montrer que  $\varphi_{\frac{1}{5}, 0}$  est une symétrie vectorielle orthogonale par rapport à un plan vectoriel que l'on déterminera.

### Partie B

Soit  $\mathcal{E}_3$  un espace affine euclidien d'espace vectoriel associé  $E_3$ .

Soit  $R = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  un repère orthonormé de  $\mathcal{E}_3$ .

Soit  $f$ , application de  $\mathcal{E}_3$  vers  $\mathcal{E}_3$  qui au point  $M$ , de coordonnées  $(x; y; z)$  dans  $\mathbb{R}$ , associe le point  $M'$  de coordonnées  $(x'; y'; z')$  définies par

$$\begin{cases} x' &= \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y + 4 \\ y' &= -\frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y - 3 \\ z' &= z. \end{cases}$$

- Montrer que  $f$  est une isométrie ponctuelle.
- Soit  $P$  le plan affine passant par  $O$ , dont un système de vecteurs directeurs est  $(\vec{i}, \vec{j})$ .  
Montrer que  $P$  est globalement invariant par  $f$ .
- Soit  $g$  la restriction de  $f$  à  $P$ .  
Montrer que l'on peut définir  $g_1$  symétrie ponctuelle orthogonale par rapport à une droite affine  $D$  et  $t_1$  translation dont le vecteur est directeur de  $D$ , telles que

$$g = g_1 \circ t_1 = t_1 \circ g_1.$$

- Soit  $P_1$  le plan affine contenant  $D$ , et parallèle à l'axe  $z'Oz$ .  
Soit  $f_1$  la symétrie ponctuelle orthogonale par rapport à  $P_1$ .  
Montrer qu'il existe une translation  $t'_1$  telle que

$$f = f_1 \circ t'_1 = t'_1 \circ f - 1$$

le vecteur de  $t'_1$  étant un vecteur de la direction de  $P_1$ .

### Partie C

Soit l'application

$$\begin{aligned} \Psi: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto -\frac{1}{3} \left[ 4(x+1) + 5\sqrt{x^2 + 2x - 2} \right]. \end{aligned}$$

**1. Étudier ses variations.**

Soit  $(\Gamma)$  sa courbe représentative. Montrer que les droites d'équation  $y = -3(x + 1)$  et  $y = \frac{1}{3}(x + 1)$  sont asymptotes à  $(\Gamma)$ , la première si  $x$  tend vers  $+\infty$  et la deuxième si  $x$  tend vers  $-\infty$ .

Tracer  $(\Gamma)$  dans le plan affine euclidien  $P$  défini à la partie **B 2.**, ce plan étant rapporté au repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

**2. Soit  $(\Gamma')$  la courbe d'équation**

$$y = -\frac{1}{3} \left[ 4(x + 1) - 5\sqrt{x^2 + 2x - 2} \right]$$

On ne demande pas de tracer  $(\Gamma')$ .

Montrer que  $(\Gamma \cup \Gamma')$  a pour équation

$$(2x - y + 2)^2 - (x + 2y + 1)^2 = 25.$$

**3. Montrer que  $(\Gamma \cup \Gamma')$  est globalement invariante par l'application  $g_1$  définie au **B. 3.****