

**Durée : 4 heures**

∞ **Baccalauréat C Pondichéry** ∞  
**septembre 1968**

**EXERCICE 1**

Sachant que l'équation;

$$x^4 - 3x^3 - 12x^2 + 48x - 64 = 0,$$

admet deux racines réelles opposées et deux racines complexes, déterminer ces quatre racines.

**EXERCICE 2**

On considère l'application qui, au nombre réel  $x$ , fait correspondre le nombre réel

$$f(x) = \sqrt{x(x-3)^2}.$$

Étudier la fonction  $f$ ; construire son graphe dans un repère orthonormé.  
Quelle particularité présente ce graphe au point d'abscisse 3?

**EXERCICE 3**

On considère, dans un plan rapporté à un repère orthonormé d'axes  $x'Ox$  et  $y'Oy$ , la transformation ponctuelle  $(T)$  qui, à tout point  $M$ , de coordonnées  $(x; y)$ , distinct de l'origine, associe le point  $M'(x'; y')$  tel que

$$\begin{cases} x' = \frac{8x}{4x^2 + y^2}, \\ y' = \frac{8y}{4x^2 + y^2}. \end{cases}$$

1.
  - a. Déterminer l'ensemble des points doubles de  $(T)$ . On trouve une courbe  $(C)$ , que l'on construira.
  - b. Calculer l'expression  $4x'^2 + y'^2$ . En déduire les expressions de  $x$  et  $y$  en fonction de  $x'$  et  $y'$ . Que peut-on en conclure pour la transformation  $(T)$ ?
2. On étudie les transformés de certains ensembles du plan par  $(T)$  :
  - a. Quel est le transformé d'une droite issue de l'origine?
  - b. Quel est le transformé d'une droite d'équation  $x = x_0$ ?  
On appellera  $(C_1)$  la courbe obtenue. Quelle est sa nature? Déterminer ses éléments remarquables. Montrer que son excentricité est constante lorsque  $x_0$  varie.

- c. Quel est le transformé d'une droite d'équation  $y = y_0$ ? On appellera  $(C_2)$  la courbe obtenue. Quelle est sa nature? Déterminer ses éléments remarquables. Montrer que son excentricité est constante quand  $y_0$  varie.

3. On considère maintenant les transformations ponctuelles suivantes :

$\mathcal{A}$  : affinité orthogonale d'axe  $x'Ox$  et de rapport  $\frac{1}{2}$ ;

$\mathcal{A}'$  : affinité orthogonale d'axe  $x'Ox$  et de rapport 2;

$\mathcal{I}$  : inversion de pôle O et de puissance 2.

(On rappelle que le produit de la transformation S suivie de la transformation  $S'$  est noté  $S' \circ S$ .)

- a. On effectue d'abord  $\mathcal{A}$ , puis  $\mathcal{I}$ , puis  $\mathcal{A}'$ . La transformation produit  $T_1$  est donc telle que  $T_1 = \mathcal{A}' \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{A}$ .

Effectuer  $T_1 \circ T_1$ . Quelle propriété de  $T_1$  en déduit-on?

- b. Le point  $M(x; y)$  est transformé par  $T_1$  en  $M'(x'; y')$ .

Exprimer  $x'$  et  $y'$  en fonction de  $x$  et  $y$ . Montrer ainsi que  $T_1$  est identique à la transformation  $(T)$ .

- c. Retrouver géométriquement les résultats des parties 1 et 2. En particulier, préciser pourquoi les coniques obtenues au 2, b et au 2, e ont même excentricité.

Démontrer, en outre, que le transformé d'une droite quelconque du plan ne passant pas par l'origine est une conique ayant encore l'excentricité déjà trouvée.