

Durée : 4 heures

∞ Baccalauréat C Reims juin 1972 ∞

EXERCICE 1

On pose, pour tout nombre réel  $x$ ,

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \text{Log}|x|, & \text{pour } x \neq 0, \\ 0, & \text{pour } x = 0 \end{cases}$$

1. Étudier la fonction  $f$  (en particulier, est-elle continue et dérivable en 0), et tracer dans un plan rapporté à un repère orthonormé la courbe  $(C)$  d'équation  $y = f(x)$ .
2. Calculer l'aire arithmétique du domaine limité par la droite d'équation  $y = 0$  et la courbe  $(C)$ , d'une part, les droites d'équations respectives  $x = \frac{1}{2}$  et  $x = 2$ , d'autre part. (On pourra intégrer par parties.)

EXERCICE 2

1. Soit  $A$  l'ensemble des couples  $(x ; y)$  d'entiers relatifs tels que

$$3x - 4y = 0.$$

Déterminer  $A$  (autrement dit, résoudre l'équation).

Le sous-ensemble,  $A$ , de  $\mathbb{R}^2$  (espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ ) en est-il un sous-espace vectoriel?

2. Soit  $B$  l'ensemble des couples  $(x ; y)$  d'entiers relatifs tels que  $3x - 4y = 2$ .

Déterminer  $B$  (autrement dit, résoudre l'équation).

Le sous-ensemble,  $B$ , de  $\mathbb{R}^2$  est-il un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ ?

PROBLÈME

1. a. On considère l'application linéaire de  $\mathbb{R}^2$  dans lui-même qui, dans la base  $(1 ; 0), (0 ; 1)$ , est représentée par la matrice

$$t = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Quel en est le noyau? Quelle est la matrice de l'application réciproque?

- b. Soit  $(P)$  un plan muni d'un repère orthonormé  $\mathcal{R} = (\text{O}, \vec{U}, \vec{V})$ . Soit  $T$  la transformation de  $(P)$  qui, au point de coordonnées  $(x ; y)$ , associe le point de coordonnées  $X ; Y$  telles que

$$X = x\sqrt{3} - y \quad \text{et} \quad Y = x + y\sqrt{3}.$$

Montrer que  $T$  est une similitude, dont on précisera le centre, le rapport et l'angle.

- c. Soit  $(E)$  l'ensemble des points de  $(P)$  dont les coordonnées  $(X; Y)$ , dans le repère  $\mathcal{R}$ , vérifient la condition

$$7X^2 + 13Y^2 - 6\sqrt{3}XY - 24X - 8\sqrt{3}Y - 16 = 0.$$

Soit  $(e)$  l'image réciproque de  $(E)$  par  $T$ . Montrer que  $(e)$  est une conique, dont on précisera la nature et le centre.

2. On pose, pour tout point  $m$  de  $(P)$ , de coordonnées  $x$  et  $y$  dans le repère  $\mathcal{R}$ ,

$$\rho = Om \quad \text{et} \quad \theta = (\vec{U}, \overrightarrow{Om})$$

(de sorte que  $x = \rho \cos \theta$  et  $y = \rho \sin \theta$ ).

On considère la conique de  $(P)$  d'équation

$$(x - \sqrt{3})^2 + 4y^2 = 4.$$

- a. Montrer que cette équation se met sous la forme

$$\rho = \frac{1}{2 - \sqrt{3} \cos \theta}.$$

- b. Quel est (dans le repère  $\mathcal{R}$ ) le nombre complexe associé à la transformation  $T$  (c'est-à-dire le nombre complexe,  $\alpha$ , tel que l'on ait  $X + iY = \alpha(x + iy)$ , pour tout couple  $(x; y)$  de nombres réels)?

Écrire sous forme trigonométrique l'affixe  $z$  d'un point  $m$  de la conique précédente.

Calculer l'affixe  $Z$  de son transformé  $M = T(m)$ ; donner la partie réelle  $X = f(\theta)$  et la partie imaginaire  $Y = g(\theta)$  de  $Z$ .

Donner, sans aucun calcul, la relation indépendante de  $\theta$  liant  $X = f(\theta)$  et  $Y = g(\theta)$ .

3. Le plan  $(P)$  est toujours muni du repère  $\mathcal{R}$ .

- a. Quelle est la matrice,  $r$ , associée à la rotation,  $R$ , de centre  $O$  et d'angle  $\frac{\pi}{6}$ ?

Quelle est la matrice,  $a$ , associée à la transformation,  $A$ , qui, au point de coordonnées  $(x; y)$ , fait correspondre le point de coordonnées  $(x; 2y)$ ?

Soit  $S$  la transformation  $R \circ A \circ R^{-1}$ . Calculer la matrice,  $s$ , qui lui est associée.

- b. On note  $t$  la matrice définissant la transformation  $T$ . Calculer  $st$  et  $ta$ .

Quelle est la nature géométrique de l'image de la conique  $(e)$  par la transformation  $S \circ T$ ?

4. Soit  $m$  un mobile dont les coordonnées sont données en fonction du temps  $\tau$  par

$$x = \sqrt{3} + 2 \cos \tau \quad \text{et} \quad y = \sin \tau.$$

- a. Quelle est la trajectoire de  $m$ ? Calculer, à l'instant  $\tau$ , les vecteurs vitesse et accélération de  $m$ .
- b. En quels points de la trajectoire le mobile a-t-il un vecteur accélération orthogonal au vecteur vitesse?