

Durée : 4 heures

∞ Baccalauréat S Centres étrangers 15 juin 2009 ∞

EXERCICE 1

5 points

Commun à tous les candidats

1. Restitution organisée de connaissances :

Prérequis : On rappelle que deux évènements A et B sont indépendants pour la probabilité p si et seulement si : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

Soient A et B deux évènements associés à une expérience aléatoire.

- a. Démontrer que $p(B) = p(B \cap A) + p(B \cap \bar{A})$.
- b. Démontrer que, si les évènements A et B sont indépendants pour la probabilité p , alors les évènements \bar{A} et B le sont également.

2. **Application :** Chaque matin de classe, Stéphane peut être victime de deux évènements indépendants :

- R : « il n'entend pas son réveil sonner » ;
- S : « Son scooter, mal entretenu, tombe en panne ».

Il a observé que chaque jour de classe, la probabilité de R est égale 0,1 et que celle de S est égale à 0,05. Lorsque qu'au moins l'un des deux évènements se produit, Stéphane est en retard au lycée sinon il est à l'heure.

- a. Calculer la probabilité qu'un jour de classe donné, Stéphane entende son réveil sonner et que son scooter tombe en panne.
- b. Calculer la probabilité que Stéphane soit à l'heure au lycée un jour de classe donné.
- c. Au cours d'une semaine, Stéphane se rend cinq fois au lycée. On admet que le fait qu'il entende son réveil sonner un jour de classe donné n'influe pas sur le fait qu'il l'entende ou non les jours suivants.

Quelle est la probabilité que Stéphane entende le réveil au moins quatre fois au cours d'une semaine? Arrondir le résultat à la quatrième décimale.

EXERCICE 2

5 points

Réservé aux candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

On se propose dans cet exercice, d'étudier des propriétés d'un solide de l'espace.

L'espace est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(3; 4; 0)$; $B(0; 5; 0)$ et $C(0; 0; 5)$. On note I le milieu du segment $[AB]$.

1. Faire une figure où l'on placera les points A, B, C, I dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
2. Démontrer que les triangles OAC et OBC sont rectangles et isocèles.

Quelle est la nature du triangle ABC ?

3. Soit H le point de coordonnées $\left(\frac{15}{19}; \frac{45}{19}; \frac{45}{19}\right)$.

- a. Démontrer que les points H, C, I sont alignés.
 - b. Démontrer que H est le projeté orthogonal de O sur le plan (ABC).
 - c. En déduire une équation cartésienne du plan ABC.
4. Calculs d'aire et de volume.
- a. Calculer l'aire du triangle OAB. En déduire le volume du tétraèdre OABC.
 - b. Déterminer la distance du point O au plan (ABC).
 - c. Calculer l'aire du triangle ABC.

EXERCICE 2**5 points****Réservé aux candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité**

1. On note (E) l'équation $3x + 2y = 29$ où x et y sont deux nombres entiers relatifs.
 - a. Déterminer un couple d'entiers solution de l'équation (E).
 - b. Déterminer tous les couples d'entiers relatifs solutions de l'équation (E).
 - c. Préciser les solutions de l'équation (E) pour lesquelles on a à la fois $x \geq 0$ et $y \geq 0$;

2. Intersections d'un plan avec les plans de coordonnées


L'espace est muni du repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et on désigne par \mathcal{P} le plan d'équation $3x + 2y = 29$.

- a. Démontrer que \mathcal{P} est parallèle à l'axe (Oz) de vecteur directeur \vec{k} .
- b. Déterminer les coordonnées des points d'intersection du plan \mathcal{P} avec les axes (Ox) et (Oy) de vecteurs directeurs respectifs \vec{i} et \vec{j} .
- c. Faire une figure et tracer les droites d'intersection du plan \mathcal{P} avec les trois plans de coordonnées.
- d. Sur la figure précédente, placer sur la droite d'intersection des plans \mathcal{P} et (xOy) , les points dont les coordonnées sont à la fois entières et positives.

3. Étude d'une surface

\mathcal{S} est la surface d'équation $4z = xy$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Les figures suivantes représentent les intersections de \mathcal{S} avec certains plans de l'espace.



- a. S_1 désigne la section de la surface \mathcal{S} par le plan (xOy) .
Une des figures données représente S_1 laquelle?
- b. S_2 désigne la section de \mathcal{S} par le plan \mathcal{R} d'équation $z = 1$.
Une des figures données représente S_2 , laquelle?
- c. S_3 désigne la section de \mathcal{S} par le plan d'équation $y = 8$.
Une des figures données représente S_3 , laquelle?

- d. S_4 désigne la section de \mathcal{S} par le plan \mathcal{P} d'équation $3x + 2y = 29$ de la question 2.
 Déterminer les coordonnées des points communs à S_4 et \mathcal{P} dont l'abscisse x et l'ordonnée y sont des entiers naturels vérifiant l'équation $3x + 2y = 29$.

EXERCICE 3**4 points****Commun à tous les candidats**

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse choisie. Dans le cas d'une proposition fausse, on pourra donner un contre-exemple.

- Pour tout complexe z , $\operatorname{Re}(z^2) = (\operatorname{Re}(z))^2$.
- Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
 Pour tout nombre complexe z non nul, les points M d'affixe z , N d'affixe \bar{z} et P d'affixe $\frac{z^2}{\bar{z}}$ appartiennent à un même cercle de centre O .
- Pour tout nombre complexe z , si $|1 + iz| = |1 - iz|$, alors la partie imaginaire de z est nulle.
- Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
 Quels que soient les nombres complexes z et z' non nuls, d'images respectives M et M' dans le plan complexe, si z et z' vérifient l'égalité $|z + z'| = |z - z'|$, alors les droites (OM) et (OM') sont perpendiculaires.


EXERCICE 4**6 points****Commun à tous les candidats**

Soit n un entier naturel.

On note f_n , la fonction définie sur l'ensemble \mathbb{R} des nombres réels par :

$$f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1 + e^{-x}}.$$

On note \mathcal{C}_n la courbe représentative de f_n dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Les courbes \mathcal{C}_0 , \mathcal{C}_1 , \mathcal{C}_2 et \mathcal{C}_3 sont représentées ci-dessous :



Partie A : Quelques propriétés des fonctions f_n et des courbes \mathcal{C}_n

1. Démontrer que pour tout entier naturel n les courbes \mathcal{C}_n ont un point A en commun. On précisera ses coordonnées.
2. Étude de la fonction f_0
 - a. Étudier le sens de variation de f_0 .
 - b. Préciser les limites de la fonction f_0 en $-\infty$ et $+\infty$. Interpréter graphiquement ces limites.
 - c. Dresser le tableau de variation de la fonction f_0 sur \mathbb{R} .
3. Étude de la fonction f_1
 - a. Démontrer que $f_0(x) = f_1(-x)$ pour tout nombre réel x .
 - b. En déduire les limites de la fonction f_1 en $-\infty$ et $+\infty$, ainsi que son sens de variation.
 - c. Donner une interprétation géométrique de 3. a. pour les courbes \mathcal{C}_0 et \mathcal{C}_1 .
4. Étude de la fonction f_n pour $n \geq 2$
 - a. Vérifier que pour tout entier naturel $n \geq 2$ et pour tout nombre réel x , on a :

$$f_n(x) = \frac{1}{e^{nx} + e^{(n-1)x}}.$$

- b. Étudier les limites de la fonction f_n en $-\infty$ et en $+\infty$.
- c. Calculer la dérivée $f'_n(x)$ et dresser le tableau de variation de la fonction f_n sur \mathbb{R} .

Partie B : Étude d'une suite liée aux fonctions f_n

On pose, pour tout entier naturel n : $u_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

1. Calculer u_1 puis montrer que $u_0 + u_1 = 1$. En déduire u_0 .
2. Démontrer que, pour tout entier n : $0 \leq u_n \leq \int_0^1 e^{-nx} dx$.
3. Calculer l'intégrale : $\int_0^1 e^{-nx} dx$. En déduire que la suite (u_n) est convergente et préciser sa limite.