

## ♣ Baccalauréat S Sportifs de haut-niveau septembre 1997 ♣

### EXERCICE 1

4 POINTS

On considère les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies pour tout entier naturel  $n$  par :

$$\begin{cases} u_0 &= 0 \\ u_{n+1} &= \frac{3u_n + 1}{4} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 &= 2 \\ v_{n+1} &= \frac{3v_n + 1}{4} \end{cases}$$

1. Calculer  $u_1, u_2, u_3$  d'une part et  $v_1, v_2, v_3$  d'autre part.
2. Dans un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  (unité graphique : 5 cm), tracer les droites  $D$  et  $\Delta$  d'équations respectives  $y = \frac{3x+1}{4}$  et  $y = x$ .  
Utiliser  $D$  et  $\Delta$  pour construire sur l'axe des abscisses, les points  $A_1, A_2, A_3$  d'abscisses respectives  $u_1, u_2, u_3$ , ainsi que les points  $B_1, B_2, B_3$  d'abscisses respectives  $v_1, v_2, v_3$ .
3. On considère la suite  $(s_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $s_n = u_n + v_n$ 
  - a. Calculer  $s_0, s_1, s_2, s_3$ . À partir de ces résultats, que peut-on conjecturer pour la suite  $(s_n)$  ?
  - b. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que la suite  $(s_n)$  est une suite constante.
4. On considère la suite  $(d_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $d_n = v_n - u_n$ .  
Montrer que la suite  $(d_n)$  est une suite géométrique.  
Donner l'expression de  $d_n$  en fonction de  $n$ .
5. En utilisant les résultats des questions 3. b. et 4. b., donner l'expression de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .
6. Montrer que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergent. Préciser leurs limites.

### EXERCICE 2

4 POINTS

Le plan est rapporté à un repère orthonormal direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  (unité graphique : 4 cm).

On considère les points A et C d'affixes respectives  $a$  et  $c$ . On suppose que les points O, A, C ne sont pas alignés.

On note B le point image de A par la rotation de centre O et d'angle  $-\frac{\pi}{2}$  et D le point image de C par la rotation de centre O et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

1. Dans cette question, on suppose que  $a = 3 + \frac{1}{4}i$  et  $c = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ .  
Placer sur une figure les points O, A, B, C, D (on justifiera la construction du point C).  
*Dans les questions suivantes, on revient au cas général*  
On suppose que les points B et C sont distincts.
2. Calculer les affixes des vecteurs  $\overrightarrow{AD}$  et  $\overrightarrow{BC}$ .  
Comparer les longueurs AD et BC et démontrer que les droites (AD) et (BC) sont perpendiculaires.

3. On désigne par I le milieu du segment [AC]. En utilisant les affixes de deux vecteurs que l'on précisera, démontrer que la médiane (OI) du triangle OAC est une hauteur du triangle ODB et que  $BD = 2OI$ .
4. La médiane issue de O dans le triangle ODB est-elle une hauteur du triangle OAC? Justifier la réponse.

**EXERCICE 2****4 POINTS****Enseignement de spécialité**

Dans le plan orienté, on considère quatre points E, F, G, H non alignés, tels que EFGH soit un parallélogramme de centre O.

On désigne par A l'image de G par la rotation  $r$  de centre O et d'angle  $-\frac{\pi}{2}$ .

On désigne par B l'image de H par la rotation  $r'$  de centre O et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

On note I le milieu du segment [GH].

1. Placer ces différents éléments sur une figure.

L'objet de cet exercice est de démontrer que la médiane (OI) du triangle OGH est une hauteur du triangle OAB. À cet effet, on propose deux méthodes.

**2. Emploi des nombres complexes**

On rapporte le plan complexe à un repère orthonormal direct d'origine O, tel que l'affixe du point G est égale à 1. On note  $z$  l'affixe du point H.

Calculer les affixes des points I, A et B en fonction de  $z$ .

Prouver que les points O et I sont distincts ainsi que les points A et B.

Montrer que la droite (OI) est perpendiculaire à la droite (AB).

**3. Emploi de transformations**

On désigne par  $h$  l'homothétie de centre G et de rapport 2.

- Déterminer les images par  $h$  des points O et I.
- Déterminer l'image par  $r'$  du point E.
- Conclure.

**PROBLÈME****11 POINTS**

On considère la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  par :

$$f(x) = x \ln \left( 1 + \frac{1}{x^2} \right) \quad \text{si } x > 0 \quad \text{et} \quad f(0) = 0.$$

On note  $\mathcal{C}$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  (unité graphique : 5 cm).

Le but du problème est d'étudier certaines propriétés de la fonction  $f$ .

**A. Étude d'une fonction auxiliaire**

On considère la fonction  $g$  définie sur l'intervalle  $]0 ; +\infty[$  par

$$g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{x^2 + 1}$$

1. a. Calculer la dérivée  $g'$  de  $g$ .

$$\text{Montrer que pour tout } x \in ]0 ; +\infty[, g'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x(x^2 + 1)^2}.$$

- b. Étudier le signe de  $g'(x)$  selon les valeurs de  $x$ .
2. Déterminer la limite de  $g$  en  $+\infty$ .
3. Déterminer la limite de  $g$  en 0.
4. a. Dresser le tableau des variations de  $g$ .
- b. En déduire qu'il existe un unique nombre réel  $\alpha > 0$  tel que  $g(\alpha) = 0$ . Vérifier que  $0,5 < \alpha < 0,6$ .
5. Déduire des questions précédentes le signe de  $g(x)$  sur l'intervalle  $]0 ; +\infty[$ .  
On ne demande pas de construire la courbe représentative de la fonction  $g$ .

### B. Étude de la fonction $f$

1. Montrer que pour tout  $x \in ]0 ; +\infty[$ , on a  $f'(x) = g(x)$ . En déduire les variations de  $f$  sur  $]0 ; +\infty[$ .
2. a. Calculer la limite quand  $x$  tend vers  $+\infty$  de  $xf(x)$ .  
(On pourra poser  $h = \frac{1}{x^2}$ ).
- b. En déduire que  $f(x)$  tend vers 0 quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .
3. Étude de  $f$  en 0.
- a. Déterminer la limite de  $f$  en 0. (On pourra écrire  $f(x)$  sous la forme  $f(x) = x \ln(x^2 + 1) - 2x \ln x$  et on utilisera le résultat suivant :  $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ .)
- b. Étudier la dérivabilité de  $f$  en 0. Préciser la tangente à la courbe  $\mathcal{C}$  au point 0.
4. Encadrement de  $f(\alpha)$ .
- a. Prouver que, pour tout élément  $x$  de  $[0,5 ; \alpha]$ ,  $0 < f'(x) < f'(0,5)$ .
- b. En déduire que, pour tout élément  $x$  de  $[0,5 ; \alpha]$ ,  $0 < f(\alpha) - f(0,5) < (\alpha - 0,5)f'(0,5)$ ,  
puis que  $0 < f(\alpha) - f(0,5) < \frac{1}{10}f'(0,5)$ .
- c. En déduire une valeur décimale approchée de  $f(\alpha)$  à  $10^{-3}$  près.
5. Dresser le tableau des variations de  $f$ . Donner l'allure de la courbe  $\mathcal{C}$ .

### C. Calcul d'une aire

Soit  $\lambda$ , un nombre réel appartenant à l'intervalle  $]0 ; 1[$ .

1. En utilisant une intégration par parties, calculer l'intégrale  $J_\lambda = \int_\lambda^1 f(x) dx$ .

Donner une interprétation géométrique de cette intégrale.

2. Calculer  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} J_\lambda$ .

On admet que cette limite est l'aire de la partie du plan constituée des points dont

les coordonnées  $(x; y)$  vérifient : 
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$$

En déduire la valeur de cette aire exprimée en  $\text{cm}^2$ .