

☞ Baccalauréat Strasbourg juin 1949 ☞  
Série mathématiques

**I.- 1<sup>er</sup> sujet**

Résoudre un triangle, connaissant deux côtés  $b$  et  $c$  et l'angle compris entre ces deux côtés,  $\hat{A}$ .

**I.- 2<sup>e</sup> sujet**

Résoudre un triangle, connaissant les trois côtés.

**I.- 3<sup>e</sup> sujet**

Transformer en produit la somme ou la différence de deux sinus ou cosinus; préciser l'utilité de cette transformation.

**II.**

Soit un triangle ABC, dont le côté BC est porté par une droite fixe D, et dont l'angle A garde, dans tout le problème, une grandeur constante  $\alpha$ , inférieure à  $90^\circ$ .

Le triangle ABC est variable, mais son orthocentre H est un point fixe.

1. Démontrer que le cercle circonscrit au triangle ABC passe par un point fixe.  
Construire le triangle ABC, connaissant le point H, la droite D, l'angle  $\alpha$ , et, en plus, la longueur  $a$  du côté BC.  
Discuter.
2. Soient  $B'$  et  $C'$  les inverses des points B et C dans l'inversion qui a pour pôle H et pour puissance  $4k^2$ , carré de la distance de H à la droite D, que l'on désigne par  $2k$ .  
Déterminer l'enveloppe de la droite  $B'C'$ .  
Démontrer que le cercle circonscrit au triangle HBC reste tangent à un cercle fixe dont on calculera le diamètre en fonction de  $k$  et de  $\alpha$ .
3. Démontrer que le cercle (O) circonscrit au triangle ABC reste tangent à un cercle fixe.  
Trouver le lieu de son centre O et celui du centre de gravité G du triangle ABC.
4. Étudier le cercle inverse du cercle de diamètre BC, dans l'inversion définie au 2.  
Calculer son rayon.  
Démontrer que le cercle de diamètre BC reste tangent à deux cercles fixes, symétriques par rapport à BC, que l'on déterminera.