

## ∞ Baccalauréat C (oral) Strasbourg juin 1968 ∞

### Exercice 1

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, les coordonnées d'un point variable  $M$  sont, définies en fonction du temps,  $t$ , par les formules suivantes :

$$\begin{cases} x = a(1 + \cos 2t), \\ y = b \sin 2t, \end{cases} \quad (a > b > 0).$$

1. Quelle est la trajectoire de ce mobile?
2. Calculer, en fonction de  $t$ , la longueur de son vecteur vitesse.
3. Déterminer l'hodographe du mouvement du point  $M$ .

### Exercice 2

Soit (E) l'ensemble des points du plan rapporté à un repère orthonormé dont les coordonnées,  $x$  et  $y$ , satisfont la relation suivante :

$$y^2 = ax^2 + bx + c,$$

où  $a, b$  et  $c$  désignent des nombres réels donnés.

Étudier, suivant les signes de  $a$  et de  $4ac - b^2$ , la nature de l'ensemble (E).

### Exercice 3

On considère, dans le plan complexe, deux points fixes, A et B, d'affixes  $a$  et  $b$ , et un point variable  $M$ , d'affixe  $z$ . Soit  $Z$  le nombre complexe défini par

$$Z = \frac{z - a}{z - b}$$

1. Déterminer l'ensemble des points  $M$  tels que  $Z$  ait un module,  $r$ , donné.
2. Déterminer l'ensemble des points  $M$  tels que  $Z$  ait un argument  $\theta$  donné (à  $k\pi$  près).
3. Dédire de ce qui précède la construction du point  $M$  tel que,  $c$  étant l'affixe d'un point donné C,  $Z$  soit le complexe conjugué de  $\frac{c - a}{c - b}$ .

---

Les questions posées à un même candidat sont comprises entre deux traits.

### Exercice 1

1. On considère la transformation qui, dans le plan rapporté à un repère orthonormé, fait correspondre au point  $M(x; y)$  le point  $M'$  tel que

$$\begin{cases} x' = x - y + 2, \\ y' = X + y - 3. \end{cases}$$

Montrer, en exprimant  $z' = x' + iy'$  en fonction de  $z = x + iy$ , que cette transformation est une similitude directe,  $\mathcal{S}_1$  dont on précisera le centre, le rapport et l'angle.

2. Identifier de façon analogue la transformation  $\mathcal{S}_2$  définie par

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{4}x - \frac{\sqrt{6}}{4}y, \\ y' = \frac{\sqrt{6}}{4}x + \frac{\sqrt{2}}{4}y. \end{cases}$$

3. Définir géométriquement, puis, par utilisation des nombres complexes, les transformations

$$\mathcal{R} = \mathcal{S}_1 \circ \mathcal{S}_2 \quad \text{et} \quad \mathcal{R}' = \mathcal{S}_2 \circ \mathcal{S}_1.$$

En déduire  $\sin \frac{\pi}{12}$  et  $\cos \frac{\pi}{12}$ .

### Exercice 2

Un ensemble  $E$  a une structure de groupe par une loi de composition interne, notée  $\star$ . On pose,  $\forall a \in E$   $a \star a = a^2$  et, de façon générale,

$$a \star a \star a \dots \star a = a^n.$$

Montrer que, si l'on a

$$\forall a \in E, \quad \forall b \in E, \quad (a \star b)^2 = a^2 \star b^2.$$

le groupe est commutatif.

En raisonnant par récurrence, montrer que l'on a alors

$$(a \star b)^n = a^n \star b^n.$$

Résoudre, dans ce groupe abélien, l'équation suivante :

$$(a \star b)^2 \star x^2 \star a \star b^2 = c \star x \star (a \star b)^3.$$

### Exercice 3

Dans une rotation,  $\mathcal{R}$ , de centre  $A$  et d'angle  $\alpha$ , tout point  $M$  du plan se transforme en un point  $M'$ .

Soit  $I$  un point fixe du plan.

- Déterminer l'ensemble, (E), des points  $M$  tels que la droite  $MM'$  passe par le point I.
- Déterminer l'ensemble,  $(E'_1)$ , des points  $M$  tels que,  $k$  étant une constante positive donnée, l'on ait  $\frac{IM}{IM'} = k$  et l'ensemble,  $(E'_2)$ , des points  $M$  tels que,  $\theta$  étant donné, compris entre 0 et  $2\pi$ , l'on ait

$$(IM, IM') = \theta \pmod{\pi}.$$

[Pour la recherche de  $(E'_1)$  et  $(E'_2)$ , on pourra utiliser le point  $I'$ , transformé de I par la rotation  $\mathcal{R}$ .]

### Exercice 1

On considère, dans le plan complexe, l'inversion  $(\mathcal{I})$ , de pôle O et de puissance  $k^2$ ; cette inversion transforme tout point  $M$ , d'affixe  $z$  non nulle, en un point  $M'$ , d'affixe  $z'$ .

- Montrer que,  $\bar{z}$  désignant le complexe conjugué de  $z$ , on a

$$z' = \frac{k^2}{z}.$$

- À l'aide de cette relation montrer que  $(\mathcal{I})$  est une transformation involutive; chercher l'ensemble des points invariants; définir le produit de deux inversions positives de pôle O, ainsi que le produit de  $(\mathcal{I})$  et d'une homothétie de centre O.  
Chercher enfin les figures transformées par  $(\mathcal{I})$  des cercles de centre O et des droites du faisceau de sommet O.

### Exercice 2

- On considère la fonction

$$y_1 = \frac{4e^{2x+3} - 6}{6e^{2x+3} + 3}.$$

Calculer la dérivée,  $y'_1$ , de  $y_1$  par rapport à  $x$ , puis, en posant  $e^{2x+3} = X$ , calculer la dérivée de  $y_1$  par rapport à  $X$  et retrouver le résultat précédent.

- D'une façon analogue, étant donné la fonction

$$y_2 = \frac{4e^{-2x-3} - 6}{6e^{-2x-3} + 3}.$$

calculer de deux façons la dérivée,  $y'_2$ , de  $y_2$  par rapport à  $x$ .

3. Soit la fonction

$$y = \frac{4e^{|2x+3|} - 6}{6e^{|2x+3|} + 3}.$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de cette fonction au point d'abscisse  $x = -\frac{3}{2}$ .

### Exercice 3

On considère la transformation ponctuelle  $\mathcal{T}$  qui, dans un repère orthonormé  $(Ox, Oy)$ , peut faire correspondre au point  $M$ , d'affixe  $z$ , le point  $M'$ , d'affixe

$$z' = (\alpha + \beta i)z + (1 - \lambda i), \quad \alpha + \beta, \lambda \in \mathbb{R}.$$

- Déterminer  $\alpha$  et  $\beta$  de telle façon que  $\mathcal{T}$  soit une similitude directe de rapport 2 et d'angle  $\frac{3\pi}{2}$ .
- Les paramètres  $\alpha$  et  $\beta$  étant ainsi fixés, déterminer, lorsque  $\lambda$  varie, l'ensemble des centres de ces similitudes.

Déterminer  $\lambda$  de façon que la droite  $Oy$  se transforme en la droite  $Ox$ .

La similitude est alors parfaitement définie; soit  $\Omega$  son centre. Deux points distincts,  $A$  et  $B$ , de  $Oy$  se transforment en deux points distincts,  $A'$  et  $B'$ , de  $Ox$ .

Montrer géométriquement que les cercles  $(OAA')$  et  $(OBB')$  se recoupent en  $\Omega$ .

### Exercice 1

Déterminer deux entiers naturels,  $a$  et  $b$  ( $a < b$ ), ayant pour somme 264 et pour plus grand commun diviseur 12.

### Exercice 2

- Dans le plan rapporté à un repère orthonormé,  $x'Ox$ ,  $y'Oy$ , on désigne par  $\mu$  le symétrique d'un point  $m(x; y)$  par rapport à la première bissectrice des axes de coordonnées et par  $m'$  le symétrique du point  $\mu$  par rapport à l'axe  $x'x$ .

Calculer les coordonnées  $(x'; y')$  du point  $m'$  en fonction des coordonnées  $(x; y)$  du point  $m$ .

Quelle est la transformation qui fait passer de  $m$  à  $m'$ ?

- Soit  $\mathcal{T}$  la transformation dans laquelle le point  $m(x; y)$  a pour transformé le point  $M(X; Y)$  tel que

$$\begin{cases} X &= 1 + y, \\ Y &= 1 - x. \end{cases}$$

Montrer que cette transformation est une rotation, dont on précisera le centre et l'angle.

**Exercice 3**

Énoncer le théorème de Gauss.

**Exercice 4**

Calculer l'intégrale indéfinie suivante :

$$\int \frac{1}{x \operatorname{Log} x} dx.$$